

TROUBLES DU CONTROLE DES IMPULSIONS ET PARKINSON

Survenue , au cours de la maladie de Parkinson, de troubles compulsifs pouvant être associés.

- Achats pathologiques
- Jeu pathologique (grattage,..)
- Addiction à Internet
- Compulsions alimentaires
- Hypersexualité(conjoint, sites internet)
- Répétition stéréotypée de tâches sans but (punding)

Peuvent être associés à une addiction à la L DOPA. Indépendants de l'évolution vers une démence ;

Facteurs de risque :

- Prédominance masculine.
- Age jeune
- Traitement agoniste dopaminergique : REQUIP, SIFROL, NEUPRO

Traitement

- L'arrêt du traitement fait céder les troubles dans 90 % des cas.
- Eviter les autres agonistes
- L DOPA ou stimulation chirurgicale.
- Traitement antidépresseur : grande souffrance morale, culpabilité, divorce, risque suicidaire
- Mesures de protection juridique

Prévention

- Repérage des patients à risque : antécédents d'addiction, ..
- Recherche des troubles à chaque consultation : interrogatoire du patient , de l'entourage.
- Nécessité d'information préalable
- Risque médico-légal ++
- Attention à la prescription des agonistes dans d'autres indications : syndrome des jambes sans repos,..